3.me Observation.

Sur une carie ~~considérable arrivée~~ ~~au~~ [du] tibia
jambe droite.
a la suite d'un coup de sabot.

Jean Nicolas Guelin âgé de 14. ans reçu le 24. Janvier 1762. un coup de pied vers la tubérosité du tibia. la douleur, la tension, et l'inflammation qui survinrent avec rapidité firent que lon amenat le malade sur le champ couché sur un brancard afin que je l'examinas, en effet l'examen fait de la situation de sa jambe, eu égards aux accidens ~~primitifs~~ ne me donnerent aucuns doute non seulement que ~~l'étegumens communs~~ [les tegumens] avoient beaucoup souffert mais ~~de plus~~ [encore] que le perioste étoit des plus contus et des plus affectés ~~non seulement~~ par l'inflammation et le gonflement de la partie antérieure de la jambe, ~~mais encore~~ [A] par la douleur vive et pongitive que cet enfant disoit ressentir pour peu que lon touchat à la partie affectée [l'etat de la maladie reconnue] il fallut ~~donc~~ soulager le malade, et les premiers moyens que ~~l'art me fournit~~ [# que j'employai] furent ~~employés~~ les saignées plus ~~ou moins~~ [deux fois] repetées, les [remèdes] antiphlogistiques et la diete. Ces moyens quoiques appliqués a propos et sans retard furent insuffisans pour arrêter le progrès de l'inflammation qui se communiqua non seulement aux cellulles osseuses mais de plus au canal de la moële comme il sera facile de le voir dans le courant de l'observation que j'ay l'honneur de présenter aujourd'hui à l'académie. Il ne fut ~~donc~~ pas possible malgré toutes les précautions prises de résoudre et de déterminer les humeurs stagnantes et arretées dans la partie malade, de reprendre les voyes ordinaires et de rentrer dans leurs propres vaisseaux, de là, foyer et abscès dans la partie affectée qui ne ~~me~~ fut point difficile à reconnoitre par l'elevation de la peau, la fluctuation et le mouvement d'ondulation de la matière contenue dans la tumeur, je pris pour lors le parti de l'ouvrir dans toute sa longueur et le pus qui en sortit étoit foetide et d'une couleur verdatre, ~~l'écoulement de ce pus fait, me donna~~ [j'eus] la facilité [pour lors] de voir que le tibia ~~non seulement~~ étoit denué de son périoste, mais de plus que sa partie compacte par la couleur noire que j'y remarquai, étoit alterée, je n'eus point d'autre soin que d'appliquer dessus les medicamens capables de procurer l'exfoliation de ~~l'eau~~ [l'os] alterée. Les choses paroissoient être dans un assez bon état lorsque le malade voulant un jour se lever sur ~~son~~ [son] lit, afin de

ARC 39 n° 163

pourvoir à quelques besoins, fit soutenir à la jambe malade tout le poids du corps. Ce mouvement imprudemment fait lui causa une fracture dans l'endroit ou s'etoit formé le dépot, c'est à dire à la tubérosité du tibia, cet évenement confirma l'idée que j'avois ~~eu non~~ ~~seulement~~ de l'inflammation ~~non seulement~~ du perioste interne mais de plus de sa supuration. Je me servis pour lors du bandage à dix huit chefs pour contenir les ~~eaux~~ os, étant obligé de lever souvent l'appareil pour panser l'ulcere la quantité de pus et la mauvaise qualité me confirmerent dans l'idée ou j'étois comme je l'ai dit au commencement de cette observation, et de l'abscès dans le canal et de l'altération du tissu spongieux de l'extremité supérieure du tibia. —

L'ulcere faisant chaque jour de nouveaux ravages je pris le parti de mettre à découvert l'endroit de la carie, c'est à dire d'agrandir l'incision que j'avois faite avec l'intrument tranchant au moyen du cautere — potentiel ~~actuel~~ que j'appliquai sur toute l'etendue de la carie; ce qui forma au bout de 7. à 8. heures d'application une large et profonde escarres — dans les parties molles qui environnoient l'etendue de la carie, sept à huit jours étant écoulés, terme assez suffisant pour la chute de l'escarres je cauterisai pour lors la portion d'os alterée et suffisamment découverte, c'est à dire j'appliquai le cautere actuel tout le long de la partie antérieure du tibia depuis son extremité supérieure jusqu'à sa partie moyenne presque inférieure. Ce que j'ay repeté plusieurs — fois ~~reprises~~. J'ay mis en usage dans le courant ~~restant~~ du traitement les medicamens ~~dessicatifs~~ ~~je veux dire tous remettre~~ remedes capable d'absorber les humidités de l'os et de ~~en~~ faciliter plus promptement l'exfoliation. Un mois après la derniere application du cautere actuel je detachai une esquille (a) ~~d'une longueur et~~ très enfoncée ~~d'une profondeur considérable~~ comme il est facile de le remarquer par l'exposition des pieces que j'ay l'honneur de presenter à l'academie.

(a) fort longue et

On voit du coté interne de cette esquille principale une partie de la concavité ou se trouvoit renfermé la moële. Il s'en est détaché d'autres assez considerables dans la suite, et la supuration a entrainé tout ce que je n'ai pu remarquer pendant les pansemens. La régeneration des substances perdues a été des plus rapides et la cicatrice s'est faite en tres peu de tems, de sorte que cet enfant (b) pour qui on avoit opiné de lui couper la jambe dans plusieurs consultations qui se sont faites dans le tems, auroit subi ce triste sort sans mes representations et mon opposition formelle pour l'opération, je priai

(b) s'est servi de sa jambe comme avant l'accident a[illegible] ete apres d'un enfoncement a sa partie anterieure et moyenne du tibia.

donc qu'on me laissat conduire la maladie de cet enfant, qu'avec le tems et la patience cette maladie étoit susceptible de guerison sans amputation, effectivement la conduite que j'ay ~~tenue~~ pendant tout le traitement a fait voir qu'il ne faut jamais se presser dans de pareils cas, et qu'il faut tout attendre et esperer de ~~l'Art~~ la nature seconde de ~~la nature~~ l'art voila ce qui forme la ~~Sainte~~ bonne pratique et le vrai chirurgien

Ce jeune garçon se leve et se promene actuellement, et aidé d'une bequille il allonge la jambe se soutient dessus et même appuie la plante du pied sur terre en marchant. Le 24. Novembre 1762. jour que M.rs de la Martiniere, Andouillé, Houstet, Lafaye, Coutaveaux, Perron, Duclos, Busnel, Mertrude, Majault, &c.a me firent l'honneur de venir a Bicestre, je leur montrai cette jambe dont ils parurent fort satisfaits ~~de la bonne situation ou ils la trouverent et elle continue a bien aller~~.

Boiare

Académie nationale de médecine Bibliothèque

Fin de la 3.me Observation.

4.me Observation.

Sur une carie considerable de la partie anterieure du tibia de la jambe gauche.

La nommée Genevieve Barault fut envoyée de la Salpêtrière, à Bicestre au mois de Juillet de l'année 1762. à l'effet d'y passer les grands remedes, en conséquence je la visitai en arrivant et ne reconnut aucuns des simptômes apparents qui caracterisent la maladie Vénérienne; sinon un ulcere fistuleux à la partie antérieure du tibia ce qui me donna ~~J'eus~~ lieu de soupçonner que cette fistule étoit entretenue par quelque alteration alors, j'en fus bientot convaincu par le pus sereux et noir dont l'appareil étoit teint ~~je veux dire la charpie et les compresses~~, la sonde que j'introduisis dans l'ulcere et que je fis parcourir dans toute l'etendue de la fistule me fit encore mieux reconnoitre # que le tibia étoit ~~non seulement~~ dénué de son perioste, ~~mais~~ et de plus carié ~~la dénudation du tibia, de son perioste, et la carie~~ par les differentes asperités que la sonde rencontra sur sa surface. comme cette carie étoit recouverte par des chairs fongueuses et livides je fis avec l'instrument tranchant les incisions convenables pour decouvrir ~~tout a~~ fait l'etendue de la carie, les premiers 24. heures écoulées ~~aprés~~ la playe ~~les incisions~~ faite, j'appliquai le cautere actuel sur toute l'etendue de la carie, lequel cautere a été repeté autant de fois qu'il a été nécessaire, ayant eu soin de recouvrir l'os a chaque pansement tantôt avec la charpie seche lorsque j'etois obligé de me servir du cautere, et d'autres fois avec la charpie mouillée, c'est à dire, trempée dans la teinture de mirrhe et d'aloës, le tout recouvert d'un digestif ordinaire, j'avois la précaution de tems en tems d'ebranler avec une feuille de mirthe la portion d'os cauterisée afin d'accelerer le détachement ou l'exfoliation de la partie alterée. Enfin a force de repeter toutes ces ~~tentatives~~, la separation de ~~toute~~ l'etendue de la carie s'est faite le 24. septembre dernier, comme il est facile de le voir par la portion d'os enlevée qui a pres de cinq pouces de longueur sur un de largeur (que j'ay l'honneur de présenter aujourdhui a l'academie) aussitot apres le détachement de cette piece d'os il s'est fait une régeneration des substances qui avoient ~~été~~ detruites ~~par le délabrement de la partie~~, de ~~en~~ sorte que les chairs qui de fongueuses et livides qu'elles étoient

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

dans les commencemens, sont devenues fermes et solides et des plus vermeilles ce qui à concouru à vue d'oeil à former une cicatrice des mieux conditionnées, a cela pres d'un leger enfoncement à la partie antérieure et moyenne du tibia, cette femme se sert très aisement de sa jambe ~~pour aller et venir~~ et elle s'y soutient sans aucuns secours c'est à dire ni bequille ni canne &c.a elle portoit cette carie depuis plus de deux ans.(a) ~~Suite d'un virus vénérien dont une partie de~~ l'humeur s'étoit deposée dans cette jambe et y avoit entretenu un vice locale ce qui est facile de prouver par la guerison radicale de cette jambe sans le secours des grands remedes (a)

M.rs Delaemartiniere, Andouillé, Bouster, Coutaveaux, Delafaye, &c.a ont aussi vu cette jambe et en ont paru très contents. (a)

(a) cette femme est sortie ~~de fait~~ de bicêtre il ya un mois très contente et des plus satisfaite de la bonne situation de sa jambe s'en servant actuellement comme si elle n'y avoit jamais rien eu

Fin de la 11.e Observation.

Boiasse

n.o 58.